

SUPRALAN ST

Обезжиривающее средство для кож и шкур

Химический состав

Этоксилат спирта жирного ряда.

Внешний вид:	жидкий, бесцветный
Содержание активной субстанции:	приблизит. 55 %
Зарядка:	не ионогенная
Значение pH (10%):	приблизительно 5 - 7
Стабильность:	стабилен к нейтральным солям, основаниям и кислотам в принятых в производстве концентрациях.
Растворимость:	растворяется в воде в любой пропорции.
Устойчивость к хранению:	при надлежащем хранении до 12 месяцев.

Свойства

SUPRALAN ST ускоряет распределение химикатов в поперечнике кожи. Значительно ускоряется процесс отмоки, материал безукоризненно раскрывается и пропитывается. Хороших результатов достигают при обезжиривании товара с натуральным содержанием жира. Предпочтительным является применение SUPRALAN ST для этого процесса во время обеззоливания и мягчения.

SUPRALAN ST может выгодно применяться для броширования товара с промежуточной сушкой, а также как стабилизатор в жировании.

Применение

Применяемые количества

Приведённое количество зависит от типа сырья и возможных концентраций ванн.

Отмока (относительно мокро – соленого веса)
до 0,5 % SUPRALAN ST

Обезжиривание (относительно веса в голье)

- овчина: до 4,0 % SUPRALAN ST

- КРС: 0,1 - 0,5 % SUPRALAN ST

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.

SUPRALAN ST

- козлиная: 0,5 - 1,0 % SUPRALAN ST

Броширование (относительно сухого веса)

До 1,0 % SUPRALAN ST

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.